Удобрение GSN 2004 для плодово-косточковых

Для повышения урожайности и улучшения качества плодов на вашем садовом участке рекомендуется использовать удобрение «GSN 2004 для плодово-косточковых культур».

Чтобы эффективно выращивать плодовые деревья, необходимо следовать основным правилам внесения удобрений. Важно соблюдать сроки и проводить от четырёх до шести этапов подкормки:

- **Первая подкормка** способствует развитию корневой системы.
- **Вторая подкормка** (во время бутонизации и завязывания плодов) помогает формированию плодов.
- **Третья и последующие подкормки** обеспечивают налив и созревание урожая.

Потребности растений в питательных веществах меняются в течение всего вегетационного периода. Весной, когда начинается сокодвижение и распускаются почки, деревьям требуется азот. Летом, после цветения, им необходим комплекс питательных веществ, включая калий, фосфор и микроэлементы.

Наш препарат «GSN 2004 для плодово-косточковых культур», кроме органической части, содержит минеральную часть в виде NPK (N-азот, P-фосфор, K-калий), поэтому дополнительная подкормка не требуется. Производитель также рекомендует дополнительно поливать деревья в засушливые периоды, так как препарат GSN 2004 действует как антистрессовое средство.

Рекомендуемые нормы обработки:

Обработка черенков: 2 литра GSN-2004 на 1 т.
Обработку семян рекомендуется проводить с применением профессионального адъюванта GSN-308 в количестве 0,02 литра на 10 литров рабочего раствора.

Листовые обработки:

1 обработка: пробуждение / почка: 3 литра GSN-2004.
Обработка с гербицидом: 0,3 литра GSN-2004.
2 обработка: бутонизация: 3 литра GSN-BORON*.
3 обработка: завязь: 4 литра GSN-2004.
4 обработка: через 14 дней: 4 литра GSN-2004.
5 обработка: через 14 дней: 4 литра GSN-2004.

Листовые обработки рекомендуется проводить с использованием профессионального адъюванта GSN-308 в количестве 0,02 литра на 100 литров рабочего раствора или с использованием другого адъюванта на выбор.

*Бор является важным микроэлементом, который способствует усвоению кальция и участвует в делении клеток. В период цветения, завязи и плодоношения он улучшает транспортировку сахаров от более развитых частей растения к плодам.

Отсутствие бора может привести к следующим проблемам:

Пятна на молодой листве и пожелтение жилок; Листья становятся мельче, скручиваются и опадают; Верхушечные почки замедляют рост, а боковые, наоборот, усиливают; Растение слабо цветёт, плоды плохо завязываются; Плоды деформируются.