Удобрение GSN 2004 для картофеля

Применение удобрения GSN 2004 для картофеля на вашем приусадебном участке поможет увеличить урожай и улучшить его качество.
Для эффективного выращивания картофеля важно соблюдать правила внесения удобрений. Специалисты рекомендуют соблюдать сроки и проводить от трёх до пяти основных этапов подкормки:
▶ при появлении всходов;
▶ после применения гербицидов (если они использовались);
▶ в период бутонизации;
▶ после цветения;
▶ на стадии созревания корнеплодов.

Первая подкормка способствует развитию корневой системы.
Вторая подкормка (в период бутонизации и цветения) стимулирует формирование клубней.
Третья подкормка обеспечивает налив и вызревание урожая.
Потребности растений в питательных веществах меняются в течение всего вегетационного периода. В начале роста картофелю необходим азот для наращивания зелёной массы, а во время формирования клубней возрастает потребность в калии и фосфоре.

Препарат GSN 2004 содержит органическую и вышеуказанную минеральную часть в виде NPK (N-азот, P-фосфор, K-калий), поэтому дополнительная подкормка не требуется. Производитель также рекомендует дополнительно поливать картофель в засушливый период или при ветрах-суховеях, так как препарат GSN 2004 обладает антистрессовым эффектом.

Рекомендуемые нормы обработки:
Обработка семян (на 1 т): 0,8 литра GSN-2004.
При обработке рекомендуется использовать профессиональный адъювант GSN-308 в количестве 0,02 л/10 л рабочего раствора или другой адъювант по выбору.
Листовые обработки (л на 1 Га):
1 обработка — всходы (10–15 см): 1,0 литра GSN-2004;
обработка с гербицидом: 0,3 литра GSN-2004;
2 обработка — бутонизация: 1,5 литра GSN-BORON*;
3 обработка — после цветения: 2,0 литра GSN-2004;
4 обработка — созревание: 2,5 литра GSN-2004.
Листовые обработки рекомендуется проводить с использованием профессионального адъюванта GSN-308 в количестве 0,02 л/100 л рабочего раствора или другого адъюванта по выбору.

*Бор — важный микроэлемент, который способствует интенсивному росту ботвы и корней, укрепляет иммунитет растений, улучшает вкус клубней и накапливает витамин С к осени. Особенно важно подкармливать бором картофель, растущий в неблагоприятных условиях, например, при избытке влаги или на глинистых почвах. Кроме того, благодаря фунгицидным свойствам удобрений с бором картофель меньше подвержен парше.

Удобрение GSN 2004 для картофеля

▶ **ЗАПРЕЩЕНО** использовать совместно с препаратами содержащими ХЛОР, а также ВОДОПРОВОДНУЮ ХЛОРИРОВАННУЮ воду.

▶ **РАЗРЕШЕНО** совместное использование с другими препаратами с одну баковую смесь (например, фунгицид, инсектицид или удобрения). Рабочий раствор на основе GSN 2004 можно использовать как «транспорт» для внесения растворенных в воде других препаратов за счёт его гигроскопичности.

▶ **РЕКОМЕНДАЦИИ:** раздельное применение рабочего раствора на основе GSN-2004 дает усиленный эффект. Устойчивый синергетический эффект от цикличного применения.